

2012 Recommended Immunization for Persons Aged 0-6 Years			
Texas			
Preventable Disease (Enfermedad)	Vaccine (Vacuna)	Dose (Dosis)	Schedule (Edad)
Tuberculosis	Not used in the United States (No se usa en los Estados Unidos)		
Hepatitis B	HepB	First (1ra.) Second (2da.) Third (3ra.)	Birth (al nacer) 1-2 m 6-18 m
Rotavirus	RV	First (1ra.) Second (2da.) Third (3ra.)	2 m 4 m 6 m
Polio	Polio IPV Inactivated Poliovirus (Polivirus inactivada)	First (1ra.) Second (2da.) Third (3ra.) Fourth (4ta.)	2 m 4 m 6 - 18 m 4 - 6 yrs
Haemophilus Influenzae type B	Hib	First (1ra.) Second (2da.) Third (3ra.) Fourth (4ta.)	2 m 4 m 6 m 12 - 15 m
Diphtheria, Tetanus, Pertussis (Difteria, Tétanos y Tos Ferina)	DTaP	First (1ra.) Second (2da.) Third (3ra.) Fourth (4ta.) Fifth (5ta.)	2 m 4 m 6 m 15 - 18 m 4 - 6 yrs
Pneumococcal Infections (Infecciones por Neumococo)	PCV	First (1ra.) Second (2da.) Third (3ra.) Fourth (4ta.)	2 m 4 m 6 m 12 - 15 m
	PPSV	2-6 Yrs* for high risk groups (2-6 años para grupos de alto riesgo)	
Influenza Children receiving this vaccine for the first time should receive a 2nd dose 4 weeks after the first dose. (Niños que la reciben por primera vez, deben recibir una 2da dosis 4 semanas después)	Influenza	Yearly (anualmente)	6 m - 6 yrs
Measles, Mumps, Rubella (Sarampión, Rubeola, Parotiditis)	MMR	First (1ra.) Second (2da.)	12-15 m 4 - 6 yrs
Varicella	Varicella	First (1ra.) Second (2da.)	12 - 15 m 4 - 6 yrs
Hepatitis A	HepA	2 doses, 6 months apart (2 dosis, seis meses aparte)	
Meningococcal	MCV/MPSV*	2-6 Yrs* for high risk groups (2-6 años para grupos de alto riesgo)	

Pan American Health Organization

2012 Vacunas Recomendadas para Personas de 0-6 Años			
Mexico			
Enfermedad (Disease)	Vacuna (Vaccine)	Dosis (Doses)	Edad (Schedule)
Tuberculosis	BCG	Única (only one)	Al Nacer (Birth)
Hepatitis B	HepB	Primera (1st) Segunda (2nd) Tercera (3rd)	Al Nacer (Birth) 2 m 6 m
Gastroenteritis (Rotavirus)	Rotavirus	Primera (1st) Segunda (2nd) Tercera (3rd)	2 m 4 m 6 m
Polio Infecciones por Haemophilus Influenzae tipo b Difteria, Tos Ferina, Tétanos	Pentavalente Acelular (DPaT+VIP+Hib)	Primera (1st) Segunda (2nd) Tercera (3rd) Cuarta (4th)	2 m 4 m 6 m 18 m
Difteria, Tos Ferina, Tétanos	DPT	Refuerzo (Booster)	4 años (Years)
Infecciones por Neumococo	Neumocócica Conjugada 7 Hepta valente	Primera (1st) Segunda (2nd)	2 m 4 m
		Tercera (3rd)	
Influenza	Antinfluenza	Primera (1st) (en Oct. o Nov.) Segunda (2nd) Revacunación- Anualmente	6 - 35 m 1 mes después de la primera Anualmente hasta los 35 meses
Sarampión, Rubeola, Parotiditis	Triple Viral SRP	Primera (1st) Segunda (2nd)	1 año 6 años
<i>Disponible en el sector privado (available in the private sector)</i>			
<i>Disponible en el sector privado (available in the private sector)</i>			
<i>Disponible en el sector privado (available in the private sector)</i>			

Organizacion Panamericana de la Salud