

| 2012 Recommended Immunization for Persons Aged 7-18 Years | | | |
|--|------------------|--|--|
| Texas | | | |
| Preventable Disease (Enfermedad) | Vaccine (Vacuna) | Dose (Dosis) | Schedule (Edad) |
| Diphtheria, Tetanus, Pertussis (Difteria, Tétanos, Tos Ferina) | Tdap | 11-12 yrs 13-18 yrs who missed 11-12 yr Tdap or those who have received a previous Td Booster | |
| Human Papillomavirus | HPV | First (1ra) Second (2da) Third (3ra.) | 11-12 years 2 m after 1st 6 m after 1st |
| Meningococcal | MCV | 11-12 yrs 7-10 yrs for high risk groups (7-10 años para grupos de alto riesgo) 13-18 yrs if not previously vaccinated (13-18 años si no se vacuno antes) | |
| Pneumococcal | PPSV | 7-18 for high risk groups (7-18 años para grupos de alto riesgo) | |
| Influenza | Influenza | 7-18 yrs annually (7-18 años anualmente) | |
| Hepatitis A | Hep A | 2 doses, 6 months apart (2 dosis, 6 meses aparte) | 7-18 yrs for high risk groups (7-18 años, para grupos de alto riesgo) |
| Hepatitis B | Hep B | 3 doses (3 dosis) | 7-18 yrs catch up immunization (7-18 años actualización) |
| Polio | IPV | 7 - 18 yrs catch up immunization (7-18 años, actualización) | |
| Measles, Mumps, Rubella (Sarampión, Rubeola, Parotiditis) | MMR | 2 doses, 4 weeks apart (2 dosis, 4 sem. Aparte) | 7-18 yrs catch up immunization (7-18 años actualización) |
| Varicella (Varicela) | Varicella | 2 doses, 3 m apart (2 dosis, 3 m aparte) 2 doses, 4 weeks apart (2 dosis, 4 sem. Aparte) | 7-12 yrs catch up immunization (7-12 años , actualización) 13-18 yrs catch up immunization (13-18 años actualización) |
| Pan American Health Organization | | | |

| 2012 Vacunas Recomendadas para Personas de 7 a 18 Años | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| Mexico | | | |
| Enfermedad (Disease) | Vacuna (Vaccine) | Dosis (Doses) | Edad (Schedule) |
| Tétanos, Difteria (Tetanus, Diphtheria) | Td | Refuerzo (booster) | A partir de los 12 años (from 12 yrs) |
| Disponible en el sector privado (available in the private sector) Se aplica en 128 municipios del país y del Distrito Federal a niñas de 11 a 13 años (It is applied in 128 municipalities and Distrito Federal to 11 to 13 yr old girls) | | | |
| Disponible en el sector privado (available in the private sector) | | | |
| Disponible en el sector privado (available in the private sector) | | | |
| Influenza | Antiinfluenza | Inicio o Refuerzo (initial or booster) | A partir de los 3 años (from 3 yrs) |
| Hepatitis A | Antihepatitis Refuerzo (booster) | Inicio o Refuerzo (initial or booster) | *En caso de brote desde el 1 er año* (*In case of outbreak from 1 yr) |
| Hepatitis B | Antihepatitis B | *2a dosis al mes de 1ra dosis* (*2nd dose one month after first) | A partir de los 12 años (from 12 yrs) |
| No Disponible (Not available) | | | |
| Sarampión, Rubeola, parotiditis | SRP Trip Viral | Refuerzo cuando no se aplicó a los 6 años Después a los 7 años se aplica SR (Sarampión y Rubeola) en única dosis) (Booster when not applied at 6 yrs. After 7 yrs SR single doses) | |
| Disponible en el sector privado (available in the private sector) | | | |
| Organizacion Panamericana de la Salud | | | |